

### 3ª LISTA DE MÉTODOS MATEMÁTICOS - PGMCM

PROF. GRIGORI CHAPIRO

Esta lista corresponde ao capítulo 6 do livro do W. E. Boyce e R. C. DiPrima e ao capítulo 5 do livro do D. G. Figueredo “Equações Diferenciais Aplicadas”.

#### REFERÊNCIAS

- [1] Figueiredo, D.G. e Neves, A.F., *Equações diferenciais aplicadas*, IMPA, Rio de Janeiro, 2002.
- [2] Boyce, W.E., DiPrima, R.C., *Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno*, Sexta edição, LTC, São Paulo, 1997.

#### 1. TRANSFORMADA DE LAPLACE

**Exercício 1.** Para cada uma das funções a seguir determine se ela é admissível. Caso seja, use a definição para calcular sua transformada de Laplace:

- (a)  $f(x) = 1$ ;
- (b)  $f(x) = K$ , onde  $K$  constante negativa;
- (c)  $f(x) = x$ ;
- (d)  $f(x) = ch(x)$ ;
- (e)  $f(x) = x^n$ , onde  $n$  é um inteiro positivo;
- (f)  $f(x) = \text{sen}(bx)$ , onde  $b$ -constante;
- (g)  $f(x) = \exp(e^{x/2})$ ;
- (h)  $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 3 - x, & 1 < x < 2, \\ 1, & 2 \leq x < \infty; \end{cases}$
- (i)  $f(x) = x^x$ ;
- (j)  $f(x) = \exp(kx)$ , onde  $k$  - constante;
- (k)  $f(x) = \exp(x^2 \cos(x))$ .

**Exercício 2.** Para cada uma das funções a seguir determine se ela é admissível. Caso seja, use a definição para calcular sua transformada de Laplace:

- (a)  $f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq 2, \\ (x - 2)^2 & 2 \leq x < \infty; \end{cases}$
- (b)  $f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq \pi, \\ x - \pi & \pi \leq x < 2\pi, \\ 0 & 2\pi \leq x. \end{cases}$
- (c)  $f(x) = u_1(x) + 2u_3(x) - 6u_4(x)$ ;
- (d)  $f(x) = x + 2xu_3(x)$ .

**Exercício 3.** Usando o teorema de convergência das integrais, determine se a integral  $\int_0^\infty f(x)dx$  converge ou diverge para  $f(x)$  dada a seguir:

- (a)  $f(x) = (x^2 + 1)^{-1}$ ;  
 (b)  $f(x) = x \exp(-x)$ ;  
 (c)  $f(x) = x^{-2} \exp(-x)$ ;  
 (d)  $f(x) = \cos(x) e^{-x}$ .

**Exercício 4.** Use a definição da transformada de Laplace para obter todas as fórmulas da parte de cima da Tabela 1. (Note que algumas fórmulas você já obteve no Exercício 1.)

TABELA 1. Tabela de transformada de Laplace

$f(x) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$	$F(s) = \mathcal{L}\{f(x)\}$	$f(x) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$	$F(s) = \mathcal{L}\{f(x)\}$
1	$\frac{1}{s}, s > 0$	$\exp(ax)$	$\frac{1}{s-a}, s > a$
$x^n, n \in \mathbb{Z}_+$	$\frac{n!}{s^{n+1}}, s > 0$	$\text{sen}(ax)$	$\frac{a}{s^2 + a^2}, s > 0$
$\cos(ax)$	$\frac{s}{s^2 + a^2}, s > 0$	$\text{sh}(ax)$	$\frac{a}{s^2 - a^2}, s >  a $
$ch(ax)$	$\frac{s}{s^2 - a^2}, s >  a $	$e^{ax} \text{sen}(bx)$	$\frac{b}{(s-a)^2 + b^2}, s > a$
$e^{ax} \cos(bx)$	$\frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2}, s > a$	$u_c(x)$	$\frac{e^{-cs}}{s}, s > 0$
$u_c(x)f(x-c)^1$	$e^{-cs}F(s)$	$e^{cx}f(x)^1$	$F(s-c)$
$f(cx)$	$\frac{1}{c}F\left(\frac{s}{c}\right), c > 0$	$\frac{x^{n-1}e^{kx}}{(n-1)!}$	$\frac{1}{(s-k)^n}, 1 \leq n, k < s$

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(x)\} = s^n F(s) - s^{n-1}f(0^+) - \dots - f^{(n-1)}(0^+)$$

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^x f(x-t)g(t)dt\right\}^2 = \mathcal{L}\{f(x)\} \mathcal{L}\{g(x)\} = F(s)G(s)$$

## 2. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE VALOR INICIAL (PVI)

**Exercício 5.** Usando a Tabela 1, ache a transformada inversa de Laplace das seguintes funções:

- (a)  $F(s) = \frac{3}{s^2 + 4}$ ;

<sup>1</sup>Estas relações tem o nome de Teoremas de Deslocamento.

<sup>2</sup>Esta integral tem o nome de integral de convolução das funções  $f$  e  $g$ .

(b)  $F(s) = \frac{4}{(s-1)^2};$

(c)  $F(s) = \frac{3s}{s^2 + 4s - 1};$

(d)  $F(s) = \frac{48s}{2s^2 - 8s - 4};$

(e)  $F(s) = \frac{1}{s^2 + 1} - \frac{2s}{(s-1)^2};$

(f)  $F(s) = \frac{(s-2)e^{-s}}{s^2 - 4s + 3};$

(g)  $F(s) = \frac{e^{-s} + e^{-2s} - e^{-3s} - 5e^{-4s}}{s}.$

**Exercício 6.** Use a transformada de Laplace para resolver os PVI's a seguir:

(a)  $y'' - 5y' + 6y = e^x, y(0) = y'(0) = 1;$

(b)  $y' + 3y = x \operatorname{sen}(ax), y(0) = -1;$

(c)  $y'' + y = x^2 + 1, y(\pi) = \pi^2, y'(\pi) = 2\pi;$

(d)  $y'''' - 4y = 0, y(0) = y'(0) = y'''(0) = 0, y''(0) = 1;$

(e)  $y'' + 2y' + y = 4e^{-x}, y(0) = 2, y'(0) = -1.$

**Exercício 7.** Use a transformada de Laplace para resolver os PVI's a seguir:

(a)  $y'' + y = f(x), y(0) = 0, y'(0) = 1, f(x) = 1 - u_\pi(x)$  para  $x > 0;$

(b)  $y'' + 2y' + 2y = h(x), y(0) = 0, y'(0) = 1, h(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < \pi, \\ 1, & \pi \leq x < 2\pi; \\ 0, & 2\pi \leq x. \end{cases}$

(c)  $y'' + 4y = \operatorname{sen}(x) - u_{2\pi}(x) \operatorname{sen}(x - 2\pi), y(0) = 0, y'(0) = 0;$

(d)  $y'' + 4y = \operatorname{sen}(x) - u_\pi(x) \operatorname{sen}(x - \pi), y(0) = 0, y'(0) = 0.$

**Exercício 8.** Usando a integral de convolução encontre a transformada inversa de Laplace para as funções:

(a)  $F(s) = \frac{1}{s^2(s^2 + 1)};$

(b)  $F(s) = \frac{s}{(s+1)(s^2 + 4)}.$